Las copias impresas o respaldadas en algún medio externo al servidor de Boston Medical Device se consideran copias no controladas (sólo para información) salvo que una leyenda impresa indique lo contrario.

FICHA TÉCNICA
DuoDERM® GEL
PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

PRODUCTO	
Nombre genérico	Gel Hidroactivo.
Nombre comercial	DuoDERM® Gel Hydroactivo.
Descripción	Gel hidroactivo e hidrocoloide.
Registro sanitario	602C95 SSA.
Usos	Diseñado como auxiliar para el manejo de heridas de espesor parcial y total, como son las úlceras de presión y las úlceras en las piernas. El gel crea un ambiente cicatricial húmedo que favorece el proceso natural de autolisis para la desbridación.
Presentaciones	187990 - 10 tubos de 15g. 187987 - 3 tubos de 30g.
Composición del producto	Sustancias hidrocoloides: Carboximetil Celulosa Sódica – Pectina. Otros componentes: Agua y Propilenglicol.
Marca	ConvaTec.
Fabricante	ConvaTec Limited.
Características y acciones del producto	Hidratación del tejido seco: penetrando en el lecho de la herida, hidratándolo y favoreciendo el desbridamiento autolítico: remoción del tejido necrótico de forma natural y selectiva. Mantiene el ambiente húmedo: favorece la promoción y formación del tejido de granulación. Mantiene el pH ligeramente ácido: reduce los riesgos de infección, por mayor actividad de los macrófagos en el control del crecimiento bacteriano. Absorbe y dona humedad: Por ser un gel amorfo tiene la capacidad de absorber y donar humedad según la necesidad de la herida. Promedio de duración 3 a 7 días.
Recomendaciones de uso	• Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. • Valorar el lecho de la lesión (condiciones de la herida) y la piel circundante. • La limpieza del lecho de la lesión y la piel circundante con solución salina normal, sin utilizar soluciones antisépticas • Remover la mayor cantidad de tejido necrótico posible antes de iniciar la terapia • Aplicar una capa gruesa de DuoDERM® Gel sobre el tejido necrótico o rellenar el fondo de la lesión cavitada hasta tres tercios de su profundidad. • Cubrir con un apósito secundario que mantenga la humedad (Hidrocoloide). • Nunca cubrir con gasa seca. • No debe utilizarse en individuos con sensibilidad o que hayan presentado reacción alérgica al gel o a sus componentes. • La esterilidad está garantizada a menos que el envase unitario esté dañado o abierto antes de su uso. • Temperatura de conservación 10°C – 25°C.
Empaque secundario	Caja de cartón.
Empaque primario	Tubo de aluminio con tapa rosca.
País de origen	Reino Unido.
Vida útil	3 años.